













# Infectious Diseases Weekly Report City of Kita

## 感染症発生動向調査／北区感染症週報

2008年7週-8週(2月11~24日)

東京都北区保健所 保健予防課 結核感染症係 電話 (3919)3101







### 1 北区感染症サーベイランス (4年間の北区一定点医療機関あたり報告人数)



#### 今週のコメント(第7週-8週)

■ 今週は内容が多く紙面を分けたので別紙をご参照ください。

※「麻疹」、「風しん」は2008年1月から全数把握対象疾患【5類感染症】になりました。



疾病別の〈北区〉定点医療機関数

疾病	医療機関数	疾病	医療機関数	疾病	医療機関数
インフルエンザ	8	手足口病	4	急性出血性結膜炎	1
不明発しん症	4	伝染性紅斑		流行性角結膜炎	1
MCLS		突発性発しん		性感染症	
咽頭結膜熱		百日咳			
A群溶血性レンサ球菌		ヘルパンギーナ			
感染性胃腸炎		流行性耳下腺炎			
水痘		RSウイルス感染症			

※ 最近3週間の北区一定点医療機関あたり報告人数 (区内定点からの全報告人数/北区定点医療機関数)

	不明発しん症	MCLS	インフルエンザ	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	RSウイルス感染症	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
6週	0.00	0.00	5.25	0.00	0.00	9.75	1.25	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7週	0.00	0.00	3.87	0.00	0.00	11.50	0.50	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
8週	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	8.25	0.25	0.00	0.25	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

2 北区内の医療機関からの麻しん、風しんの届出数

	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	9週(2月26日現在)	2008年累計
麻しん	0	1	0	0	0	1	2	0	1	5
風しん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律から、最近の感染症発生動向を送付いたします。東京都および、厚生労働省による集計分については下記のインターネットのホームページでご覧になれます。

- 東京都感染症情報センターのホームページアドレス  
<http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/weekly/index-j.html>
  - 厚生労働省/国立感染症研究所感染症情報センターのホームページアドレス  
<http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>
- (別紙) 定点把握対象疾患報告数【保健所別】、【年齢階級別】

今週のコメント（第7週-8週）

■ インフルエンザ

北区のインフルエンザ定点からの第8週の患者報告数は、定点あたり3.25人と第5週の9.5、第6週の5.25、第7週の3.87から3週連続して減少しています。東京都でも減少傾向ですが、区内学校で、第9週になってインフルエンザによる学級閉鎖の報告があり、しばらくは動向に注意が必要です。

■ インフルエンザについて詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

東京都感染症情報センター <http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/flu/index.html>  
 厚生労働省 <http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/index.html>  
 国立感染症情報センター <http://idsc.nih.go.jp/disease/influenza/index.html>

■ インフルエンザやほかのウイルスによるかぜの感染拡大防止のために、『咳エチケット』に協力ください。

- ① せきやくしゃみが出るときは、マスクをしましょう。
- ② せきやくしゃみをするときは、ティッシュで口と鼻をおおきましょう。
- ③ 使ったティッシュは、ほかの人が触らないように、ごみ箱にすてましょう。
- ④ せきやくしゃみをした後は、よく手を洗いましょう。

■ ノロウイルスなどを原因とする感染性胃腸炎報告数も依然として多い状況です。感染予防対策として、日常的に、外出後や食事前の手洗い・うがいを徹底しましょう。吐物や排泄物の処理時にも注意が必要です。詳しくは、東京都感染症情報センターのホームページをご覧ください。  
<http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/noro/index.html>

■ 全国各地で麻しんの流行が報告されています。定期予防接種の対象者で未接種の方は、できるだけ早くワクチン接種を受けましょう。

■ 麻しん風しん混合ワクチンは平成19年度から2回接種になりました。第1期（1歳児）と第2期（5～7歳未満で小学校に就学する前の1年間）の2回の接種を受けましょう。  
 ～麻しん風しん混合ワクチンを1歳の誕生日のプレゼントに！  
 小学校入学準備に2回目の麻しん風しん混合ワクチンを！～

■ 平成20年1月1日から、麻しん、風しんは全数報告となりました。第8週に2例、麻しん患者発生の届出（いずれも成人）がありました。区内学校で麻しん発生の報告もあり、流行期を迎え注意が必要です。

（参考）北区内の医療機関からの麻しん、風しんの届出状況【グラフ】

